Zones bioclimatiques compatibles



SORBUS AUCUPARIA - SORBIER DES OISELEURS
(ROSACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 5-15m
- **Envergure :** 4m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 500mm
- **Température annuelle moyenne :** 7 à 11°C
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** sorbe ; fin août-septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** baies très recherchées par les oiseaux
- **Autre(s) caractéristique(s) :** supporte très bien le recépage







Niveau hydrique \ Niveau trophique	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X	■	■	■	■	■	■
m	■	■	■	■	■	■
f	■	■	■	■	■	■
h	■	■	■	■	■	■
hh						
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*



Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

SORBIER DES OISELEURS